

Как смена молочных зубов у ребенка влияет на звукопроизношение

Смена молочных зубов – это естественный этап развития ребенка. Обычно, с 5-6 до 11-13 лет, она может временно влиять на звукопроизношение.

Порядок выпадения молочных зубов очень индивидуален для каждого ребенка. Чаще всего выпадение старых зубов происходит в той же последовательности, в какой они когда-то прорезывались. Кроме того, не следует забывать, что количество «детских» (молочных) и «взрослых» (постоянных) зубов неодинаково.

Какие речевые недостатки может заметить родитель при смене зубов у ребенка?

1. Временная «ШЕПЕЛЯВОСТЬ» и искажения свистящих

Когда выпадают передние зубы (особенно резцы), меняется поток воздуха при произнесении свистящих и шипящих звуков: С,З,Ц,Ш,Ж,Ч.

Ребенок может: «шепелявить» или «свистеть» сильнее обычного, или произносить звук между зубами. Это происходит потому, что зубы учувствуют в формировании узкой щели для прохождения воздуха.

2. Нарушение артикуляционной опоры

Зубы – это опора языка. При их отсутствии язык может: выдвигаться вперед, занимать неправильное положение, формировать межзубное произношение.

3. Временное ухудшение звука «Р»

Если у ребенка уже был поставлен звук «Р», он может стать менее четким. Если «Р» еще не был поставлен, период смены зубов – не самый удобный момент для начала активной логопедической работы.

4. Адаптационный период

После прорезывания постоянных зубов артикуляция снова меняется – ребёнку нужно время, чтобы «настроить» привычные движения языка.

Как помочь ребёнку в период смены молочных зубов?

❖ Во время смены молочных зубов логопед работает аккуратно и стратегически: важно поддерживать правильную артикуляционную базу и не дать закрепиться ошибкам.

❖ Работа над слуховым контролем. Важно, чтобы ребенок слышал разницу между правильным и искаженным звуком.

❖ «Осторожная» звукопостановка.